Robin noir

Vass3R02s146-150

SINA Collection Vassal-Montpellier

155Mtp1

Taken Nave is

Robin moi N 0155.01 3 R2 S146.150







Désignation: Robin mon

Clos Planche 10 Côté S Nº 110

Vigueur: 2

Charge :

Date de mâturité 27. 8. 16

2.2

Désignation : Robin noil -

Clos Planche 10 Côté P Nº 110

Vigueur: 3

Charge :

1.1-0

Date de mâturité: (3 8 5

5-0

Désignation: Robin man.

Clos Planche Wooté S No 140

Vigueur : 2

Charge :

s. 10

20

30

121

58

	Nombre	i I	I I	^ ^		TES						
	total	20	23.	12.6.	1	1	! .	. 1		. !		-
1	1 2	. 0.	0.	.5.	×		1					
2	2.	0	0.	υ.	14	1 * *	1 *	. !	•	* 1	• •	
3	1	0	0.	1	I		1 °	* !	•	* !	•	•
4	1	0.	0	3	4.		! "	1	*	. !	•	*
5	1 . 3	0.	0.	.5.	K		1 *	1	•	* 1	•	*

Année 1957 Robin non

	! [Nombre ! total !	14/3/57	7/3	: 11-3	114/3	ES!	Ţ.	Ī	1
1	1 .6.	1 .0.	.0.	1 .3.	: 4	1 X	1	!	1
2	.6.	1 .0. 1	.0.	1.	4	1 X	i i		1
3	1.4.	.0	.0.	1	3.	1			1
4	: .4.	1.1.	1.	2.	1.3.	Y			!
5	1 .6.	1.0.1	.0.	.0.	2				
	! 1	! ! ! !			[1
			71-8		D.	2 13-3	.57		

Nº Côté 10 \$ 110

Nombre total	19.3	122/3	27-/3	D A	TES	!	1 t		1	
.6.	. a	1 0:	3.				1		!	
:6.	. 0.	1 0 1	2		! !		!		1	
.6.	.0.	1 0	.3.4!		! !		1		1	
.4.	.21.	13.	.4. x 1		! !		1		1 .	
.6.	.0.	1 .0 . 1	٥. ا		! !		1 .		1	
	.6. .6. .6.	6 a 6 o 6 o 6 o 4 2!	19.3 22/3 .6	19.3 22/3 27/3 6. a 0 3 x 6. o 0 2 6. o 0 3 x 4. 21 3 4 x	19.3 22/3 27/3 A .6. 0 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4	total 19.3 22/3 27-/3 E S	total 19.3 22/3 27/3 1 E S 3.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	total 19.3 22/3 27/3 1	6	6

D & 27-3-58

0 E E -AMMER. 1 1988 EMPLACEMENT. 3 R2 & 146_ 150 MON Robin noir N C33M BM 0155.01 Thoraison Véraison début mi/v fin maturet. Ferti-Hbre Débourrament thire. iche debut mi/deb grap 1166 уенк 255 2Hit 64-08 26-5 22.5 10 12.3-2613 14 1 5 12.3 19.3 Compacité : L - 11- C Grappo : 3 - H - P Dim : 10 16.3-26.3 rour : Mill: 12.3 19.3 a, Baig : To - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré 26 37 Saveur : s - m - ar - fox - herb J. le 2 3.98 (+9 réplas : avec - apyrène Vigueur : Fort :

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté S Nº 110 Souche † 2345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 la four cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trust 10-5-57

Désignation : Robin noir

VASSAL Planche lo Côté S Nº 110 Souche 12 34 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
- fathement carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT transparentes, bullantes _

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 faillement aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Désignation : Robin non

Planche 10 côté No MO souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 d. glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9 ·
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colo-rées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

par defleur C. Samson 181,5,5%

Nº ordre

Designation: Rolin noir

VASSAL Planche (0 côté \$ Nº 110 souche 1 2 3 4 5

(F) HAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: male 7 - hermaphrodite 8 - femel-

Landier 14-6-55

No ordre

Désignation Robin voir

VASSAL planche 10 côté 5 No souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte Partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court(3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Trust 22-7-57

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté S Nº 110 souche 1 23 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 seteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvereux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 diveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe : plan O- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte (1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3) .
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Trust 7.7-56

```
Robin nois
    Désignation
              planche Wcôté 5 No Wo souche (1) 2 3 4 5
    VASSAL
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 🕟
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8) - non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant () - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
   - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - A jus incolore (1) - coloré 2,
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
- A saveur neutre 1 - fade 🕼 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacés 5 - spéciale 7.
   - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court(3)
   - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 🐔 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évidont () - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyer 6 - long 6,
   - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Nº d'ordre

BRoch 4. 9. 56

```
Dénomination . Robin ... muin .
Sarment de Vigne.
            : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
  17
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (P).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3),
                autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
   11
             : pruinée (!), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2) à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
   11
Villosité
           : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
              violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
  11
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
                                                                     Boriel
```

130mich 4-12-56

Nº d'ordre : Désignation : Plolin . moin. Emplacement:... vas. 10 5110. Vign. 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3. 12 - S. lat. sup. (prof.), 0 - 1 -(2)-(3). 14 - S. pét. (forme). 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 5. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 -(2)-3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1-2-3 Direction : 4-5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8

DiBane 52

DO.
Nº d'ordre: 0.155.01 . Désignation: . R.o front moi.
Origine:
Emplacement:
8 - Angle des nervures
9 - L ₁ /L · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10 - L ₂ / L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 3
13 - S. lat. inf. (prof.)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)
16 - Dents: forme
17 - Dents : Méd. /B 1 - (2)- 3.
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P , 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ :
22 - Largeur S.P.:
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1)-(2)-3.
Forme : (3)-5
Médiane/Base: 6-(7)-(8)

Formulaire de description 2/8

(floraison)

Année: 1838

Code cépage 0155

Code clone: 61

Nom cépage : Robin moir N

Observateur : lacombe

Emplacement: 3 R2A146_150 03 3 M BM

Bourgeonnement

oiv 001 forme : globulcuse 3 - demi-ouverte 5 ouverte

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente D en liseré 2 - partout 3

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible (D- faible 3 - moyenne 5

forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 005 densité poils dressés nulle ou très faible D-faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4 premières feuilles) : verte 1 jaune 2 - plages bronzées 3 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible (D- faible 3

movenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) nulle ou très faible T faible 3

movenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) nulle ou très faible & faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) nulle ou très faible () faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières)

Profil: étalées (1) - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204 Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible ①- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 -

plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera

notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225 Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 -

très forte 219.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Densité poils couchés sace sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très sorte 9 Couleur face sup.: blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 -

plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233

Formulaire de description 3/8

(floraison)

Année: 1558

Code cépage : 0155

Code clone

Nom cépage : Robin moir N

Observateur Lacombe

Emplacement 3R2s146_150

C3. PMBM

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé D demi-érigé 3- horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds verte - verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds verte verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte T - verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 010 couleur face ventrale noeuds ; verte 1 - verte à raies rouges 🕖 rouge 😗

oiv 011 densité poils dressés noeuds ; absence 1 - présence 9

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds ; nulle ou très faible 1 « moyenne 5 » forte 9

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds, nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons nulle ou très faible (1) faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 015* pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible D- moyenne ? - forte ou très forte 3

oiv 016 distribution vrilles : discontinue (2 ou moins) - subcontinue ou continue (3 ou plus) 2 oiv 017 longueur vrilles : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) (5) longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3)- femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1º inflorescence : jusqu'au 4º noeud (1) - au-delà du 4º noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau : I ou moins I - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelés 2)

Villosité spéciale du rameau herbacé : aucune 288 et 289 - épines ou analogues 243 - poils massifs 244.

Couleur des vrilles verte 260 - jaune 26) - rouge 262 et 263.

Formulaire de description 4/8 (entre nouaison et véraison)

Année: 1938

Code clone : el

Code cépage: 0155 Nom cépage : Robin moir N Observateur

Emplacement: 3 R2 & 146-150

C3 PM BM

Feuille adulte

oiv 065 taille : très petite 1 - petite 3) - moyenne 5) - grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1)- trois 2)- cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7.

oiy 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1)- point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente I - présente 9

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures 1 at II) : absente T)- présente 9.

oiv 074 profil: plan pen gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faible 3- moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible (1)- faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1) - faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1- présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1- présente 9

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible D - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible(1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible [1] - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

Couleur du pétiole : vert (78) - partiellement coloré 177 - coloré 176.

Formulaire de description 5/8

(maturité)

Année:

1998

Code cépage : 0155 Nom cépage: Robin moir N

Code clone: 1

Emplacement: 3 R2 A 146 - 150 C3 ZMBM

Observateur:

Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) (5)- longue

(20-30cm)(7)- très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5- large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte(7) très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule: très court (<2cm) 1 - court (2-4cm)3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement (1) moitié 5 - plus de la moitié 7.

oiv 208* forme: cylindrique 1 - conique ou pyramidale(2)

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.)

Baie

oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue

(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.

oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-

26mm) 7 - très large (>26mm) 9.

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme D - uniforme 3

oiv 223 forme: aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 -

cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir(6)

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2)

oiv 227 pruine: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 3 - forte 7 - très forte 9.

oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 7 - épaisse 7 - très épaisse 9

oiv 229 ombilic : peu apparent D- apparent 2.

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée () - colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée ① - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 -

forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2)

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3- moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9

oiv 236 saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.

oiv 236* saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle: très court (<4mm) 1 - court (4-8mm)(3) - moyen (8-12mm) 5 - long

(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen(5) - difficile 7 - très difficile 9.

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents (3)

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes () - présentes 2.

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 1938

Code clone: 1

Code cépage : 0155

Nom cépage: Robin nour N

Observateur

Emplacement: 3 R2 A 146-150

C3 PM BU

Sarment

oiv 101 section transversale circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune D brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes () présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 9- présence 9

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence D- présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (~60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5)

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit (5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal:

Nocuds: aplatis 1 - movens/2/ saillants 3.

Formulaire de description 7/8

(herbier, collecte entre nouaison et véraison)

Année: 1998

Code cépage: 0.455

Code clone: 04

Observateurs: Lacombe Larry

Nom cépage: ROBIN NOIR

Emplacement: 3R2 A146.150

Feuille d'herbier

oiv 076 forme des dents : côtés concaves I - côtés rectilignes (2 - mélange notation 2 et 4 : 3 - côtés convexes 4 - un côté concave, un côté convexe(5)

oiv 077 taille des dents : très petites 1 - petites 3 - moyennes 5 - grandes 7 - très grandes 9.

oiv 078 rapport longueur/largeur dents: très courtes 1 - courtes 3 - moyennes 🗇 - longues 🗇 - très longues 9.

oiv 079 ouverture sinus pétiolaire : très ouvert 1 - ouvert(2)- peu ouvert(3 - fermé 4 - lobes chevauchants 5 - lobes très chevauchants 6.

oiv 080 forme base sinus pétiolaire : en U(1) - en accolade 2 - en V 3.

oiv 0811 dents sur bord sinus pétiolaire : absence (1) - présence assez fréquente 1 ou 2 dents 2.

oiv 0812 sinus pétiolaire dégarni : absence 1) - présence fréquente sur un côté 2 - présence fréquente sur deux côtés 3.

oiv 082 ouverture sinus latéraux supérieurs : absence sinus (1) - ouvert 2 - fermé (3) - lobes chevauchants 4.

oiv 0831 forme base sinus latéraux supérieurs : en U 1 - en accolade 2 - en V(3)

oiv 0832 présence dent fond sinus latéraux supérieurs : absence 1)- présence fréquente 2.

Mesures ampélométriques sur feuille d'herbier

oiv 601 longueur nervure N1: très courte (<75mm) 1 - courte (105mm) 3 - moyenne (135mm) 5 -

longue (165mm) 7 - très longue (>195mm) 9. Valeur absolue (en mm): A44

oiv 602 longueur nervure N2: très courte (<65mm) 1 - courte (85mm) 3 - moyenne (105mm) 5 -

longue (125mm) 7 - très longue (>145mm) 9. Valeur absolue (en mm): 95

oiv 603 longueur nervure N3: très courte (<35mm) 1 - courte (55mm) 3 - moyenne (75mm) 5 -

longue (95mm) 7 - très longue (>115mm) 9.

Valeur absolue (en mm): 67

oiv 604 longueur nervure N4: très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 -

longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9. Valeur absolue (en mm): 43

oiv 605 distance entre point pétiolaire et sinus supérieur (S1) : très courte (<3cm) 1 - courte

(5cm) 3 - moyenne (7cm) 5 - longue (9cm) 7 - très longue (>11cm) 9. Valeur absolue (en mm): 5,2

oiv 606 distance entre point pétiolaire et sinus inférieur (S2) : très courte (<3cm) 1 - courte

(4,5cm) 3 - moyenne (6cm) 5 - longue (7,5cm) 7 - très longue (>9cm) 9. Valeur absolue (en mm): 5,5 oiv 607 angle entre N1 et N2 mesuré à la 1° bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7

Valeur absolue (en °): 61 - très grand 9.

oiv 608 angle entre N2 et N3 mesuré à la 1° bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7

- très grand 9. Valeur absolue (en °): 51

oiv 609 angle entre N3 et N4 : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9

Valeur absolue (en °): 64

oiv 610 angle entre N3 et la tangente entre le point pétiolaire et l'extrémité N5 : très petit 1 -

petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9.

Valeur absolue (en °): 52

oiv 611 largeur de la feuille : très étroite (<66m) 1 - étroite (106m) 3 - moyenne (146m) 5 - large

(18mm) 7 - très large (>22mm) 9.

Valeur absolue (en Am): 145 cm

oiv 612 longueur de la dent N2 : très courte (<6mm) 1 - courte (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 -

longue (18mm) 7 - très longue (>22mm) 9.

Valeur absolue (en mm): 8,7

Formulaire de description 7/8 (suite)

(herbier, collecte entre nouaison et véraison)

```
oiv 613 largeur de la dent N2 : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 -
                                                 Valeur absolue (en mm): AA
large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9.
oiv 614 longueur de la dent N4 : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 -
                                                 Valeur absolue (en mm): 7
longue (18mm) 7 - très longue (>22mm) 9.
oiv 615 largeur de la dent N4: très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 -
                                                 Valeur absolue (en mm): 4
large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9.
oiv 616 nbre de dents entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2 : très
petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue : 7
oiv 617 distance entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2 : très courte
                                                        Valeur absolue (en mm): 4,8
1 - courte 3 - moyenne 5 - longue 7 - très longue 9.
oiv 066.4* longueur nervure N5: très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 -
                                                 Valeur absolue (en mm): 20
longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9.
oiv 066.5* distance entre point pétiolaire et départ N4 : très courte (<4mm) 1 - courte (8mm) 3 -
moyenne (12mm) 5 - longue (16mm) 7 - très longue (>20mm) 9. Valeur absolue (en mm) : AA
oiv 079.1* ouverture/superposition du sinus pétiolaire : très ouvert (<-35mm) 1 -
ouvert (-15mm) 3 - fermé (-5mm) 5 - chevauchant (+25mm) 7 - très chevauchant (>+45mm) 9.
Valeur absolue (en mm): _5
```

Vassal:

Angle du lobe terminal : faible (<90°) 45 - moyen (=90°) 46 - grand (>90°) 47.

Formulaire de description 8bis/8

(maturité)

Année:

Code clone:

Observateur : D. Wisel

Code cépage Nom cépage

Emplacement:

Récolte

oiv 502 poids d'une grappe : très faible (<100g) 1 - faible (200g) 3 - moyen (400g) 5 élevé (800g) 7 - très élevé (>1200g) 9. Valeur absolue (en g) oiv 503 poids d'une baie : très faible (1g) 1 - faible (2g) 3 - moyen (4g) 5 - élevé (8g) 7 - très élevé Valeur absolue (en g) (>12g) 9. oiv 504 rendement en kg/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. Valeur absolue oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 505 teneur en sucre du moût : très faible (<13%) 1 - faible (15%) 3 - moyen (18%) 5 - élevé (21%) 7 - très élevé (>24%) 9. Valeur absolue (en %): oiv 506 acidité totale du moût : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. Valeur absolue (en g H2SO4/l) oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

Vassal:

	NOM: Robin mon	EMPLACEMENT: 3 R2 & 146 - 150
Vendange	Date: 02/03/98	
	Nombre de souches récoltées: 1	Poids d'une grappe (oiv 502): 2919 Poids d'une baie (oiv 503): 1,689
	Poids total de la vendange: 2,040 Kg	Poids d'une baie (oiv 503): 1,68
	Nombre total de grappes : 7	7009
	Nombre total de grappes : 7 Rendement à l'hectare : 3, 180 T	
	= (poids total / nbr souches) x 4500	
	Pourriture (%): 1	
	Couleur épiderme : Mon	
	Saveur: sams	
Pressurage	Rendement en jus (ml / 100 g baies) (oiv 233) :	32
	Indice réfractométrique (oiv 505): 3,44 2	-3,4
	Acidité moût (g H2SO4/l) (oiv 506):4,5	
	pH du moût: 3,44	
Pépins	Poids de 100 pépins secs (g): 2,20	Poids d'un pépin (oiv 243) : 0,022
	longueur des pépins (mm) (oiv 242): 5,36	% de névino creux: 4,73
		11